


Ueber zwei Fälle
von
Missbildungen.

Inaugural-Dissertation
zur
zur Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium
des
Herrn Professors Dr. von Hecker

von
Robert J. Bowie
aus San Francisco.

München 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.




Digitized by the Internet Archive
in 2026



Ueber zwei Fälle
von
Missbildungen.

Inaugural-Dissertation
zur
zur Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium
des
Herrn Professors Dr. von Hecker

von
Robert J. Bowie
aus San Francisco.



München 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Die Lehre der Mißbildungen hat seit Jahrhunderten¹⁾ die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gelenkt — über deren Entstehung und Wesen aber war bis zu Anfang dieses Jahrhunderts nur sehr wenig bekannt. Selbst heutzutage, unter dem hellen Lichte einer vorurtheilsfreien Untersuchung mit allen Hilfsmitteln einer positiven Wissenschaft, ist man kaum im Stande, die mannigfaltigen Zerstörungen oder vielmehr Verunstaltungen, die in dem kleinen Gebiete des menschlich weiblichen Uterus vor sich gehen, aufzuklären. Es scheint mir daher um so wünschenswerther; die zu beschreibenden Fälle zu veröffentlichen, in so ferne als sie geeignet sind, zum Theil jene Theorie der Art der Entstehung, die von verschiedenen Autoritäten aufgestellt, und von den meisten Autoren angenommen worden ist, nämlich die der Entzündung zu kräftigen. Außerdem bietet wenigstens der eine Fall (Tafel Fig. 1) nicht geringes Interesse dar.

Durch das freundliche Entgegenkommen Prof. Hofrath von Heckers ist es mir ermöglicht, über einen an Deformitäten luxuriös ausgestatteten Foetus zu berichten, welcher in der That ein Unicum darstellt.

Ich theile zuerst die interessante Geburtsgeschichte mit.²⁾

¹⁾ Einen kurzen historischen Ueberblick gibt Müller. Inaug. - Diss. München 1879.

²⁾ Durch Freundlichkeit des behandelnden Arztes Herrn Dr. Stadler in Dinkelsbühl gütigst zur Verfügung gestellt.

»Die Person ist eine 19 J. Primipara, ledig, mit Bestimmtheit gibt sie den 15. Juli 1879 als Tag der Conception an. Die Menfes traten zum erstenmale im 14. Lebensjahre auf, erscheinen regelmäfsig alle 4 Wochen, waren immer mit äufserst heftigen Schmerzen verbunden, so dafs sie jedesmal ein bis zwei Tage vorher das Bett hüten mußte. Ihre Schwangerschaft suchte sie so lange als möglich zu verheimlichen, und deshalb deutete man ihr krankhaftes Aussehen und das Ausbleiben der Menfes auf Bleichsucht, wegen welcher sie längere Zeit in Behandlung war.«

»Vor 3 Wochen stellte sich eine ziemliche Blutung ein, die jedoch von selbst cessirte. Seit 4 Wochen floss täglich etwas Fruchtwasser ab. Wehen begannen am Montag den 8. III. 80. Morgens 3 Uhr und sollen anfangs ziemlich energisch gewesen sein.«

»Abends 8 Uhr, am darauffolgenden Tag (also am 9. III.) wurde ich gerufen und konnte bei der außerordentlichen Schmerzhaftigkeit, die sich im Laufe des Nachmittags einstellte, nur mit grofser Mühe die combinirte Untersuchung vornehmen. Der Leib war wenig ausgedehnt, und der Uterus als ein brettharter Querwulst durchzufühlen. Foetale Herztöne nirgends zu hören. Scheide sehr eng, Mutter Mund für einen Finger durchgängig, dahinter der Rand der Placenta und nebenan eine Blase zu fühlen. Das vordere Scheidengewölbe war von einem harten, nicht gar grofsen ründlichen Körper belastet.«

»Ich dachte sofort an eine Steifslage indem ich den harten Körper für die Hüfte und die Blase für das herabgedrängte Serotum hielt — allein die äufsere Palpation widersprach ganz und gar dieser Annahme. Am anderen Morgen war der Muttermund etwa Markstückgrofs und hinter der vorliegenden Placenta und der erwähnten Blase konnten einige unregelmäfsige Gesichtsprominenzen gefühlt werden.«

»Mittags (10. III) war der Muttermund ganz erweiterbar und neben den genannten Gebilden, noch ein Arm vorgefallen. Ich entschloß mich zur Wendung auf die Füße, welche aber trotz wiederholten Versuchen unmöglich war. Der Uterus war so fest um seinen Inhalt herangelegt, daß ich nur mit der größten Mühe und nach langer Zeit, mit der halben Hand in dessen Cavum einführen konnte. Mit den Fingerspitzen fühlte ich weiche Theile, die mir den Gedanken nahe legten, daß bereits feuchte Maceration eingetreten sei. Von einem Vordringen mußte ich absehen, da der ausgesprochene Tetanus uteri, selbst durch eine $\frac{3}{4}$ stündige tiefe Chloroform-Narcofe nicht zu beseitigen war. Der Zustand der Person war auch nicht ganz unbedenklich, daher ließ ich aus der Narcofe erwachen. Nach Ablauf von 2 Stunden, während welcher Excitantien und Roborantien gereicht wurden, untersuchte ich wieder und konnte an der linken Beckenwand einen ziemlich spitzen Knochen abtasten. Ich drängte denselben etwas weg, und merkte zu gleicher Zeit, daß sich die Cyste entleerte. Beim Zurückziehen der Hand senkte sich darauf der Kopf herunter; es traten aber keine Wehen ein, so versuchte ich die Zange an dem wie mir schien verkleinerten — Kopfe anzulegen. Das erste Mal glitt sie mir ab, das zweite Mal faßte ich den Kopf gut ein, und die Extraction ging sehr leicht vor sich.«

»Der vorliegende Theil der Placenta war in Stücken abgerissen, die übrige Masse mußte ich in Fetzen manuell auflösen. Der Uterus contrahirte sich hierauf gut. Die Blutung war mäßig und stand nach Einspritzungen von kaltem Wasser bald stille. Eine leichte Ruptura perinaei war vorhanden.«

»Das Befinden der Wöchnerin ist bis jetzt (12. III) zufriedenstellend; Puls durchschnittlich 100 — Temperatur $37,1-38,5$ — Abdomen aufgetrieben und schmerzhaft.«

Nachträglich habe ich erfahren (28 III.), daß in den ersten drei Tagen das Wochenbett sehr günstig verlief. Am

4 Tage stellte sich, durch mehrere Schüttelfröste eingeleitet hohes Fieber ein, welches am Abend des 5. Tages 41,9 erreichte. Auf Darreichung 2 gr. Chinin sank die Temperatur am andern Morgen bis auf 36,0. Seit der Zeit zeigt das Fieber abendliche Exacerbationen. Morgens Remission bis auf die Norm. Der Ausfluß war eitrig und von penetrantem Geruche, Puls jedoch war voll und der Appetit stellte sich allmählig ein.

Bevor ich zur Beschreibung des Praeparats übergehe, will ich einige kurze Bemerkungen an die Geburtsgeschichte anreihen.

1. Die Blutung 3 Wochen vor der Geburt war jedenfalls in Folge des tiefen Sitzes der Placenta hervorgerufen.

2. Das Vorhandensein einer Pl. praevia ist bemerkenswerth, da sie bei Erstgebärenden eine seltene Anomalie ist. Nach einer Statistik von Hecker kommt sie überhaupt nur 1 mal in 354 Geburten vor, (nach Schwarz ist das Verhältniß wie 1:1564) und nach Zusammenstellungen von verschiedenen Autoren wird in 10 Fällen erst eine Erstgebärende getroffen. Bekanntlich ist sie ein hauptdisponirender Moment für das Zustandekommen des Abortus, und mag in diesem Falle auch die Hand im Spiele gehabt haben. In keinem mir zu Gebote stehenden Buche finde ich einer Complication von Pl. Praevia mit Mißbildung der Frucht erwähnt.

3. Der häufige Wechsel der Fruchtlage war wahrscheinlich durch die Kleinheit derselben bedingt.

4. Die Cyste am Kopfe war ein Geburtshinderniß — ein nicht ganz seltenes Ereigniß.

5. Was die feste Anlegung des Uterus um seinen Inhalt anlangt, so wissen wir, daß dieselbe durch heftige Widerstände, Reizung der Theile (z. B. durch Versuche auf Wendung), Darreichung von inneren Mitteln etc. zu Stande kommen kann. Da die beiden erstgenannten Ursachen hier vorhanden waren,

so ist die Entstehung dieser sog. „tetanischen Umschnürung“ erklärlich.

6. Die wahre Verwachsung der Placenta ist im ganzen nach Spiegelberg¹⁾ sehr selten. Ob in diesem Falle eine vorausgegangene Entzündung des Eudometriums, wie S. in allen Fällen annimmt, die Adhärenz hervorrief, muß ich dahingestellt sein lassen.

Außerlich bietet der Foetus folgendes Aussehen dar:

Körper gut entwickelt, und beträgt seine Länge 32 cm. Kopfumfang 20 cm. Biparietaler Dm. 11,0. Länge des Gesichtschädels, vom Kinn bis zur Haargrenze, 6 cm.

Das Schädeldach ist unvollkommen ausgebildet. Es fehlen äußerlich die linke Hälfte des os frontis, das ganze linke Seitenwandbein und die Schuppe des Occiputs. Die Kopfhaut an Stelle dieser Knochen ist nicht vorhanden, sondern wird ersetzt durch einen häutigen, in der vorderen Partie fibrösen, scheinbar muskulösen Sack, der vor der Geburt offenbar geschlossen war, gegenwärtig aber über die Stelle der Hinterhauptschuppe etwas nach links, von der Median Linie, eine große runde ca. 3 cm. in Diameter betragende Oeffnung zeigt. Dieser Sack trägt in seiner hinteren unteren Partie einen beutelförmigen, sich hart anfühlenden, von normaler Haut überzogenen Anhang, dessen Ansatzstelle sich scharf von der Umgebung abgrenzt, der inwendig theilweise hohl und durch eine ca. 0,5 cm in Dm. betragende runde Oeffnung, mit dem Hauptfacke communicirt. Länge des Appendix 2,5, Dicke 1,0 cm. Rechte frontal Hälfte gut entwickelt. Vom rechten os parietale fehlt die hintere Hälfte, zwischen beiden läßt sich eine tiefe Furche durchfühlen, in welcher bequem ein Finger Platz hat.

Die rechte Gesichtshälfte erscheint ausgebildet. Die linke dagegen ist der Sitz hochgradiger und complicirter Deformitäten und zwar: über die linke Gesichtshälfte hängt ein

¹⁾ S. dessen Handbuch der Geburtshülfe.

schlaffer von normaler Haut bedeckter runzlicher Sack herunter, welcher dieselbe fast bedeckt. Derselbe steht aufsen und innen mit der oben beschriebenen Kopfcyste im Zusammenhang, und haftet andererseits an der Gesichtshaut derart fest, daß das linke obere Augenlid sich ohne Grenze in derselben fortsetzt. Länge des Sackes 6 ctm. Breite 5,0. Der Sack faßt eine Flüssigkeitsmenge von ca. 60 ctm.

An der inneren Peripherie der Basis des Sackes. 0,6 ctm. nach abwärts von der Stelle, wo er sich in die facial Haut fortsetzt, befindet sich eine dreieckige nach unten sehende Oeffnung, die für eine mittelftarke Sonde bequem durchgängig ist, und in ihrem Grunde eine ventilartige, gegen die Spitze des Dreieckes zusehende Klappe zeigt, welche die Oeffnung bei Füllung des Sackes vollkommen absperrt.

Die linke orbita erscheint total verkümmert. Der Bulbus fehlt, die orbita hat eine Höhe von 0,5 ctm. und eine Breite von 0,7, (Rechts 2,0 resp. 1,5 ctm.) Oberes und unteres Augenlid sind ausgebildet — am oberen lassen sich deutlich Cilien erkennen.

An den Veränderungen der linken Gesichtshälfte nimmt auch die linke Nasenhälfte Theil. Das linke Nasenbein scheint bei äußerem Betaften zu fehlen. Eine dünne Hautfalte mit der Oberlippe zusammenhängend, zieht schief nach oben und aufsen zur Umhüllung der Cyste, geht resp. in diese über, ohne Unterbrechung, spannt sich über den linken Nasenflügel und drängt ihn gegen der Stirne hinauf. Der Nasenflügel scheint aus zwei Lappen zu bestehen, der untere hängt mittelst einer dünnen Hautspange mit der obenerwähnten Hautfalte zusammen, während sich der obere als eine frei bewegliche Hautleuze präsentirt, über welcher eine große Oeffnung in die Höhle der Kopfcyste einerseits, andererseits in das Cavum der Stirncyste hineinführt.

Außerdem haben wir eine linksseitige Hafenscharte und Fißur des Kiefers und harten Gaumens.

Der Hals ist ziemlich kurz und geht hinten direkt in die Wirbelsäule über. Die linke obere Extremität ist normal gebildet und hat eine Länge von 15 cm. Dagegen die Rechte erscheint verkürzt, Länge 8 cm. Vom Ellbogen ist keine Spur vorhanden. Am äußersten Ende der Extremität, welche im unteren Theile platt gedrückt ist, befindet sich die Andeutung einer Hand, und an derselben ein stummelförmiger Finger, und zwar ein Daumen. Lineae sulcatae sind mit der Loupe nicht nachweisbar.

Die äußere Inspection des Thorax ergibt eine mangelhafte Bildung der rechten Seite, nemlich es fehlen alle Rippen mit Ausnahme der ersten. Die Lunge liegt der Leber flach an, und ist mit ihr verwachsen. Vom Zwerchfell ist nur ein kleiner Rest übrig geblieben. Der rechte sternal Rand ist vorhanden.

Das Abdomen erscheint total eingezogen. Von den Eingeweiden befinden sich die Leber, Magen und Darm Tractus bis auf das S. Romanum, dann die Milz, Pancreas und beide Nieren außerhalb desselben. Diese Organe sind durch ziemlich schlaffes Bindegewebe fest mit einander und mit der Peripherie einer Spalte, welche sich auf der rechten Seite von der Regio axillaris schräg bis zur Höhe der Nabelstrang Insertion erstreckt, und eine Länge von 6,5, eine Breite von 2—3,5 cm. hat, verwachsen. Das Peritoneum ist nicht, wie in vielen Fällen, vorhanden, sondern hört mit der Haut auf. Uterus und Blase sind oben mit der Haut bedeckt, an der rechten Seite jedoch von außen leicht sichtbar. Letztere ist mit dem Bauchfell verwachsen, und ergoß beim Aufschneiden eine kleine Menge grauweißlicher Flüssigkeit. Die mikroskopische Untersuchung ergab Tausende von Plattenepithelien, spärliche Cylinder und Schleimepithelien, einige in concentrirter Essigsäure nicht lösbare Crystalle, wahrscheinlich von harnsauren Salzen und amorphe Massen.

Die äußeren Geschlechtstheile sind abnorm stark entwickelt.

An beiden unteren Extremitäten besteht hochgradiger Pes varus. Die Füße, (d. h. die Plantarflächen), sind stark nach hinten und etwas nach oben gerichtet.

Endlich besteht eine Scoliose der Wirbelsäule nach rechts. Die innere Untersuchung ergab Folgendes:

Von den Kopfknochen waren nur das halbe os parietale und das os frontis dext. vorhanden. Obgleich die meisten Knochen fehlten, war es doch kein Anencephalus, wie wir später sehen werden. Der an der hinteren Kopfcyste befindliche beutelförmige Anhang steht einerseits durch ein ca. 1,0 ctm. in Dm. betragendes ovales Loch mit dem Gehirn in Verbindung, andererseits geht er direkt in den Wirbelkanal über. Der sich hartanfühlende, bräunlichrothe Inhalt zeigte mikroskopisch zahlreiche Corpuscula amylicca und einzelne Ganglienzellen. Es war also ein Spina bifida unmittelbar unterhalb der Medulla oblongata.

Einen Beweis, daß es sich um keine Anencephalie handelt, liefert die mikroskopische Untersuchung der in dem mangelhaft entwickelten Schädel enthaltenen Masse. Es fanden sich die schönsten Primitivnervenfasern, sowie mitunter charakteristische Crystalle von Cholestearin und Kreatin, letzteres bekanntlich ein Zeretzungs-Produkt der Gehirnschubstanz, vor.

Die große, über die linke Orbita herabhängende Cyste stand ebenfalls mit der vorderen Hirnhemisphäre in Verbindung, sie war in der That nur eine Ausbuchtung der Gehirnhäute, eine Meningocele. Diese Gehirnhäute setzten sich in dieselbe ohne Unterbrechung fort. Der mikroskopische Befund war der gewöhnliche.

Beim Eröffnen der Thorax fand ich rechts unterhalb einer dünnen bindegewebigen Schicht einen leicht beweglichen Körper, der beim Aufschneiden des Bindegewebes sich als das Herz erwies. Ich werde hier gleich bemerken, daß ich den Zustand für keinen Situs mutatus im engeren Sinne des Wortes halte, sondern glaube, es läßt es auf mechanischem Einfluß zurück-

führen. Die Eingeweide und besonders die relativ stark entwickelte Leber haben auf die zurückgebliebenen Brustorgane einen festen langdauernden Zug ausgeübt, wobei letztere fortwährend gegen die Fissur zugezogen wurden.

Mit dem Kopfe anfangend, so ist das Vorkommen der Meningocele, oder Hydrencephalocoele anterior, ein relativ seltenes Ereigniß. Förster¹⁾ hat 3 Fälle abgebildet, von denen aber nur einer, eine gleichzeitige Lippen- und Gaumenspalte besaß. Ich halte den seitlichen Sack für eine wahre Hernia cerebri, welche kurz vor der Geburt platzte. Offenbar war ein leichter Grad von Hydrocephalus externus vorhanden, da der vordere Sack mit dem Gehirn durch eine so enge Oeffnung communicirte, daß das Eintreten von größeren Mengen von Gehirnmasse mir unmöglich erscheint. In 42 von Hohl²⁾ gesammelten Fällen war der Wassertack nur 15 mal in der Gegend der kleinen Fontanella oder des Foramen magnum. Diese enthielten nicht bloß Flüssigkeit, sondern auch eine weiche Masse. (Hirn?) Ziehen wir die Momente, welche auf die Entstehung, resp. Bildung von Cyften am Kopfe von Belang sind, näher in Betracht, so muß es uns sofort einfallen, daß die Entzündung hier eine Hauptrolle gespielt hat. Daß die Entzündung eine derartige Rolle zu spielen im Stande sei, ist schon längst außer Zweifel gesetzt worden. Eine große Anzahl von Autoritäten hat sich zu Gunsten dieser Theorie ausgesprochen. Aber die Frage über den Ausgangspunkt ist noch sub judice. Simpson und Simonart³⁾ schreiben ihn der foetalen Haut zu. Kristeller⁴⁾ glaubt gleichfalls an die Existenz einer Dermatitis foetalis.

Ob und in welcher Weise die amniotischen Fäden eine Wirkung auf den Foetus ausüben, behandelte casuistisch zuerst

¹⁾ Missbild. d. Menschen Atlas Taf. XVIII. 1861.

²⁾ S. dessen Lehrbuch.

³⁾ Schmidts Jahrbücher Bd. 15 S. 304.

⁴⁾ Mon. Schr. für Gebk. Bd. 14 S. 589.

Credé. Nach ihm darf das Vorkommen einer Entzündung des Amnions gar nicht geleugnet werden. Obgleich das Amnion gefäßlos sei, ist es jedoch gewissen Veränderungen unterworfen, die man nicht anders als Entzündung nennen kann. (Wagner¹⁾). Bekanntlich aber besitzt das Amnion Anfangs Gefäße, und gerade in den ersten Wochen ist eine Disposition darf man sagen zu Verbildung vorhanden. Bei einer näheren Inspection der Haut des vorderen Sackes, auch in der Abbildung zu bemerken, sieht man eine weißliche Stelle, welche den Eindruck einer narbigen Einziehung macht. Ohne Zweifel war dieses die Stelle, wo die Verwachsung mit der Schafhaut stattfand; und die Bildung der Cyste war entschieden eine nothwendige Consequenz. (Theorie von Cruveilhier). Ob vom Foetus oder Amnion ausgehend, muß ich dahingestellt sein lassen, da ich leider keine Gelegenheit hatte, die Nachgeburt einer genauen Untersuchung zu unterwerfen. Aber irgend eine andere Entstehungsweise des Wassertackes ist unbedingt auszuschließen.

Eine interessante Abweichung ist die Verwachsung der Kopfhaut mit der Placenta, wie man im Atlas von Martin²⁾ findet. Dieser Fall ist sehr selten und ruft weit größere Störungen hervor. Die Placenta bleibt häufig, sogar bis nach der Geburt, mit dem Kopfe verwachsen.

Das Vorhandensein einer Hydrorrharcis, resp. Spina bifida ist an und für sich nicht merkwürdig, nur die Stelle ist eine etwas ungewöhnliche. Sie ist fast immer mit anderen Missbildungen verbunden. Meistentheils trifft man sie in der Sacralgegend, seltener sitzt sie an den Brustwirbeln, am Aller seltensten am Halse. Früher hat man sie als für die Operation ganz ungeeignet betrachtet, da beinahe, ja alle Operirten nach wenigen Tagen zu Grunde gingen. In letzterer

¹⁾ Allg. Path. 4. Aufl. 1868 S. 546.

²⁾ Atlas d. Gebh. 2. Aufl. Taf. LXXV. Fig. 1.

Zeit sind zwei Fälle veröffentlicht worden, von Ahlfeld¹⁾ und Scolari²⁾, wo der genetische Ausgang erfolgte.

Was die Häufigkeit anlangt, so beträgt sie nach Chauffier³⁾ etwa $\frac{1}{6}$ hämmtlicher Bildungsfehler. Abnorme Lagen kommen vielfach vor.

Die Aetiologie der Hydrorrhoe ist ebenso unsicher, wie die der verschiedenen Defekte am Schädel. Für eine Anzahl von Fällen paßt die Annahme von Virchow, daß es sich um die Frühbildung partieller Hygrome, zumal in den unteren Theilen des Canals handle, aus welchen sich das Mark früh zurückzieht. Der Inhalt ist gewöhnlich cerebrospinale Flüssigkeit, die selten pulsatorische häufig aber respiratorische Bewegungen zeigt.

Die Wandungsdefekte am Schädel sind viel schwieriger zu erklären. Aus der Embryologie wissen wir, dass die Verknorpelung des häutigen Primordial-Schädels im 2. Monate beginnt,⁴⁾ während der übrige Theil, nämlich das ganze Schädeldach und ein erheblicher Theil der Seitentheile häutig bleibt. Diese Deck- oder Belegknochen entwickeln sich erst später aus einer hautartigen, morphologisch aber noch nicht bestimmten Grundlage. Kommt noch ein begünstigendes Moment hinzu, z. B. Druck von innen (Hydrocephalus), oder von außen (durch Beschränkung des dem Embryo gebotenen Raumes, wie Verbiegung der Wirbelsäule, enges Becken etc.) so können die Knochen dadurch zum Verschwinden gebracht werden. Fürst⁵⁾ spricht sich im ähnlichen Sinne aus, indem er sagt: »Durch Compression können schon entwickelte Theile zerstört oder völlig abgelöst werden.«

¹⁾ Deutsche med. Wochenschr. Nro. 44. S. 570. 1879.

²⁾ S. Annal. univers. Vol. 249 P. 266 Sett.

³⁾ S. bei Leyden Rückenmarkskrankheiten.

⁴⁾ Kölliker, Entwklg. Geschichte. II. Aufl. 1879. P. 434.

⁵⁾ Arch. für Gynaekologie II. 1871. S. 315.

Mißbildungen mit bedeutendem Defekte am Schädel sind nicht häufig beobachtet worden. Bis jetzt sind nur fünf derartige Fälle beschrieben¹⁾. Nach Credé²⁾ ist die 8. Woche die späteste Zeit, die uns die Mißbildung anzunehmen erlaubt. Da Contractionen des Uterus und Circulationsstörungen durch heftige Gemüthsaffecte oder physischer Einwirkungen sehr leicht hervorgerufen werden können, so möchte er diese als bei weitem häufigste Ursache der Verbildung des Eies ansehen und ganz besonders die Entstehung der amniotischen Fäden auf sie zurückführen. Credé sucht diese Ansicht zu unterstützen durch die Thatfache, daß bei den (Säuge)-Thieren der eine seiner Faktoren, nemlich der lebhafte Gemüthsaffect, fehlt und weniger Mißbildungen daher vorkommen. Ich will diese Thatfache nicht bestreiten, obgleich Mißbildungen bei den Thieren nicht so sehr selten sind. Daß man sie auch erschrecken kann (bes. die Hausthiere) bedarf glaub' ich meinerseits keiner Bestätigung.

Ich werde hier gleich zwei Fälle erzählen, die neuerdings in der hiesigen chirurgischen Poliklinik beobachtet wurden. Der Erste betrifft einen jungen 20 jährigen Mann. Der rechte Oberarm ist etwas weniger umfangreich wie der linke, der Vorderarm mißt 11 Ctm. in Länge, ist mit dem Humerus in einem Winkel von etwa 30° ankylosirt, und trägt an seinem Ende einen 8 Ctm. langen, passiv beweglichen Indexfinger. Der linke Arm ist normal entwickelt. Den Zustand bezeichnet man als Perochirus und wird selten bei Erwachsenen gesehen. Die Mutter soll während der Schwangerschaft durch ein im Nachbarhause entstandenes Feuer heftig erschreckt worden sein.

Beim 2. Falle, einem Mädchen von anderthalb Jahren, fand man links einen pes calcaneus, mit sehr atrophischem Beine und rechts einen pes varo equinus. Entsprechend der Stelle

¹⁾ S. Credé. Mon.-Schrift für Gebk. Vol. 33. P. 441.

²⁾ l. c.

des Trochanter major, beiderseits je eine ca. 1 Ctm. tiefe Grube. Anus fehlt, das Rectum mündet in die Vulva ein, Harn träufelt ständig ab, Blase und Urethra sind jedoch vorhanden. Eltern ganz gesund, sowie drei andere Kinder. Mutter war während der Gravidität erschrocken, dadurch, dass sie in ein Zimmer ging, wo ein Mann, der bis zu den Hüften nackt ausgezogen, im Begriffe war, sich zu rasiren.

Sebastian Münster¹⁾ theilt mit, wie die Mutter der berühmten flammefischen Zwillinge in einem bestimmten Monate ihrer Schwangerschaft durch Gegenstoß einer andern Person eine Erschütterung erlitten habe, und er ist überzeugt, dass dieses der Grund der Verwachsung sei.

Man könnte die Zahl dieser angeblichen Erschütterungen, Gegenstöße und Schrecken, bis in's Unendliche fortsetzen, einen rationellen Zweck würde es aber nicht erfüllen. Und dazu sind die meisten, wenn nicht alle solche Erzählungen total unglaubwürdig. Sie beruhen vielfach auf Täuschung. Das Publikum, und besonders der weibliche Theil desselben, ist zu sehr geneigt, auf jedes Vorkommniß während jener Zeit des Gefegnetseins, ein zu grosses Gewicht zu legen.

Die Verunstaltung der Nase hängt wahrscheinlich vom Amnion ab. Obgleich eine amniotische Falte nicht nachweisbar ist, kann die Verbildung doch davon herkommen. *Credé*²⁾. Die Hautspangen an unserem Präparat können ursprünglich amniotische Fäden gewesen sein, die eine foetale Beschaffenheit später annahmen.

Die Entwicklungsgeichte allein ist im Stande, uns die Entstehung der Gaumenkieferlippenpalte aufzuklären. Es ist ein so häufiges Ereigniß und ist so oft beschrieben worden, daß ich darauf gar nicht näher einzugehen brauche. Die Gaumenspalte ist meistentheils einfach. (*Uranochisma laterale*),

¹⁾ S. Virchow. Berlin. Wochenschrift Nr. 870. P. 153.

²⁾ a. a. O.

und ist selten für sich allein vorhanden. Bei der erwähnten Form steht meist der Vomer in Verbindung mit dem rechten Spalttrand, welcher auch den Zwischenkiefer trägt. (König¹⁾.

Von 1868—77 waren in der Zürcher Klinik²⁾ 23 eingehend einseitige z. Th. mit partieller Spalte der anderen Seite complicirte Lippenalveolar und Gaumenspalten behandelt. In 20% hereditäre Verhältnisse, in nur 2 Fälle waren andere Fehler vorhanden.

Was nun die Wandungsdefekte am Thorax anlangt, so müssen wir ebenfalls die Embryologie in Anspruch nehmen, um eine correcte Idee der Entstehung zu bekommen. Die Spaltbildungen sind fast immer Mißbildungen, die auf einem Zurückbleiben, resp. Hemmung der Entwicklung, und nicht auf einer Trennung der betreffenden Theile beruhen.

Zu einer Zeit, wo die Visceralplatten sich noch nicht vereinigt haben, liegen die Brustorgane frei an der Oberfläche. Tritt aber durch irgend welche Veranlassung eine Störung in der Entwicklung ein, so bleibt eine Verschmelzung der Ränder aus und der als Ektopie bekannte Zustand zurück. Viel häufiger ist die Haut über das Organ gespannt und nebenbei eine sogenannte Pneumatocele oder Lungenbruch. Die wahre Ektopie ist außerordentlich selten, am häufigsten ist sie mit der Acephalie verbunden. Im Gegentheil zum vorigen ist die Ektopie der Baueingeweide kein so seltenes Vorkommen, gewöhnlich ist sie auf eine kleine Spalte beschränkt, welche nur die Gedärme hindurchtreten läßt. In unserem Falle aber handelt es sich um keinen Austritt, weil von einer Reposition gar nicht zu denken ist. Es ist auch kein Nabelbruch, sondern eine Spaltung der Bauchhaut, wie wir sie oben beim Thorax beschrieben haben. Sie ist in der That nur eine Fortsetzung der Brustspalte. Die Spina bifida ist eine sehr constante Be-

¹⁾ Lehrbuch d. Chir. II. Aufl. I. Band P. 241.

²⁾ S. Fritsche, Beiträge z. Stat. u. Bhldg. d. Mißbild. Angab. Zürich 1871.

gleiterin der Ektopie, den Zusammenhang hat man bis jetzt nicht ausfindig machen können. Soviel wissen wir dafs Beide Bildungshemmungen sind aus der ersten Zeit des embryonalen Lebens.

Die Anheftung der Hand an dem Humerus nennt man Perobractius, von denen ich nur 4 andere Fälle in der Literatur gefunden habe. Es ist offenbar die Folge einer Entwicklungshemmung. Nach Winkler kann die Verkürzung der Extremität durch die Rachitis mikromellica bedingt sein.

Die Scoliose dürfte auch als eine Folge der Rachitis angesehen werden — ich habe aber keine sonstigen Erscheinungen dieser Krankheit vorgefunden und möchte sie eher als eine durch abnorme Lage hervorgerufene Krümmung der Wirbelsäule auffassen.

Endlich ist der doppelseitige Pes varus als eine notwendige Consequenz der Gehirn- und Rückenmarksdefekte zu betrachten, indem Letztere eine Neuroparalyse mit Verstellung der Füße bedingen.

Damit schliesse ich die Betrachtung dieser Mißbildung. Ich habe keine neuen Theorien aufgestellt, mein Zweck war der, die Literatur durch einen Fall, welcher, was die Zahl feiner Deformitäten anlangt, einzig und allein dasteht, zu bereichern. Vielleicht dürfte es Manchen anregen, genauere Untersuchungen über die Natur dieser Verbildungen anzustellen, um dieselben möglicherweise später zu beschränken, wenn nicht verhindern.

Der II. Foetus misst 27 ctm., dessen Geburtsgeschichte ist leider nicht vorhanden. Ich werde die Mißbildungen an demselben kurz fassen.

Ektopia viscerum, d. h. Leber und Darm.

Spina bifida am gewöhnlichsten Orte, am Kreuzbein.

Rechtsseitige Gaumenkieferlippenpalte.

Die beiden Hände stehen mit den Vorderarmen unter

einem stumpfen Winkel von etwa 75° , und sind total unbeweglich. Die rechte Hand hat keinen Finger, Index und Mittelfinger sind mit einander gänzlich verwachsen, Ring- und Kleinfinger sind vom ersten Phalanx an frei. (Syndaktylie). Eine ähnliche Mißbildung resp. Ankylosirung der Handgelenke unter einem stumpfen Winkel befindet sich in der pathologischen Sammlung zu Würzburg.

Es bleiben uns übrig, einen rechtsseitigen Pes narus und einen linksseitigen Pes valgus zu erwähnen.

Zum Schlusse sei mir noch gestattet, an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Obermedizinal- und Hofrath Profeffor v. H e c k e r, meinen Dank auszusprechen für die Liebenswürdigkeit, mit welcher er meine Arbeit durch Ueberlassung von Präparaten und Anweisung der einschlägigen Literatur bereitwilligst unterstützte.

